Bollettino Fitosanitario

ZONA PROGETTUALE	AVVERSITA'	n. 11/2026	
PIANURA INTERNA VITERBESE	Mosca dell'olivo Bactrocera oleae	dal	22/09/2026
		al	28/09/2026

Fase fenologica:	SVILUPPO DEI FRUTTI (Scala BBCH Olio 79)	"Le drupe hanno raggiunto circa il 90% delle dimensioni finali. Indurimento del nocciolo (nocciolo che lignifica mostrando resistenza al taglio)"
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Temperature inferiori a 30°C; elevata percentuale di umidità relativa ed eventi piovosi saltuarii
		Schiusa uova: T min 17° C – T max 30°. Voli notte di 16-17 ° C / giorno fino a 35° C
Metodologia:	Si esaminano 20 olive a pianta su 10 piante scelte a caso per cultivar per ettaro, un totale di 200 olive.	
Soglia di intervento:	Metodo Adulticida Olive da olio: 4-5% di punture fertili o 2 femmine ovigere/trappola/settimana Olive da mensa 1-2% di punture fertili (uova, larve, pupari)	
Rilievo infestazione:	**Attacco rilevato: 0%**	

PRESCRIZIONE

NONOSTANTE L'ABBASSAMENTO DELLE TEMPERATURE, NON SI NOTANO CAMBIAMENTI NELL'INFESTAZIONE DA MOSCA OLEARIA. PERTANTO SI CONSIGLIA DI NON EFFETTUARE TRATTAMENTI CONTRO LA MOSCA. EVENTUALMENTE SAREBBE AUSPICABILE UN TRATTAMENTO CON PRODOTTI RAMEICI AD AZIONE DISINFETTANTE E PREVENTIVA NEI CONFRONTI DELLA MOSCA.

Fonte dati climatici
ARSIAL (SIARL)

OP LATIUM Soc. Coop. Agr.
Quadrivio dei Quirani, 00018 Palombara Sabina RM
Sede legale: Via Raffaele Piria, 6 – 00156 Roma
e-mail: **collisabini@oplatium.it**
web: **www.oplatium.it / www.agroambientelazio.it**